

纽约州已提供抗原（antigen）检测试剂盒给所有学区。伊萨卡学区在这一周分发新冠病毒（COVID-19）抗原检测试剂盒给所有学生以及员工。每个试剂盒包含两个测试。以下概述是关于**建议何时在家进行新冠病毒检测**的指导。

根据以下情况自测	时间
您有任何 新冠病毒症状	立即 <i>抗原检测呈阴性并不能排除新冠病毒感染。返校前需进行 PCR（实验室）检测呈阴性。</i>
您接触了一个新冠病毒患者	接触后至少五天 <i>如果新冠病毒检测呈阴性，请考虑在第一次检测后的一至两天内再检测。</i>
您要去参加一个室内活动或聚会	在聚会前，或尽可能接近聚会时间 <i>这在与面临严重疾病风险的人、老年人、免疫功能低的人或未更新新冠病毒疫苗接种状态的人（包括尚未接种疫苗的儿童）聚集之前尤为重要。</i>
您患了新冠病毒	为期五天的隔离期即将结束。 <i>如果检测呈阳性，则继续隔离，直到症状开始出现的十天后。 如果检测呈阴性，可以停止隔离，但在症状开始出现后的十天内应佩戴口罩。</i>

来源: [疾病控制和预防中心，在家或任何地方进行自测](#)

- 自测的**阳性结果**是非常可靠的。
- 自测的**阴性结果**并不排除 SARS 冠状病毒 2 号（SARS-CoV-2）感染。阴性的自测结果可能不可靠，特别是当您有新冠病毒相关的症状时。
- 自测的**无效结果**意味着测试不能正常工作，需要进行新的检测以获得准确的结果。

如果您的孩子在自我进行抗原检测中呈阳性，您应该：

- 在检测呈阳性或出现症状后（以先出现者为准）[立即将他们隔离](#)五天；
- [填写并提交此表格](#)，将您的阳性结果报告给汤普金斯县健康中心；
- 并通知孩子的学校。

如果您的学生出现症状或症状恶化，请联系您的医疗保健医生并寻求其他治疗。在隔离后的五天内，和别人在一起的时候要继续佩戴合适的口罩。