

El estado de Nueva York ha proporcionado kits de prueba de antígeno a todos los distritos escolares. Esta semana, el distrito escolar de la ciudad de Ithaca está distribuyendo un kit de prueba de antígeno COVID-19 a todos los estudiantes y el personal. Cada kit incluye dos pruebas. A continuación se describe una guía sobre cuándo se recomienda tomar una prueba de COVID-19 en el hogar.

Tomar prueba si...	Cuando...
Tiene síntomas de COVID-19	Inmediatamente. Una prueba de antígeno negativa no descarta la infección de COVID-19. Se requiere una prueba de PCR negativa (laboratorio) para regresar a la escuela.
Estuvo expuesto a alguien con COVID-19	Al menos 5 días después de su exposición. Si su prueba de COVID-19 es negativa, considere volver a realizar la prueba 1 o 2 días después de su primera prueba.
Usted va a un evento en el interior o una reunión	Inmediatamente antes de la reunión o lo más cerca posible de la hora del evento. Esto es especialmente importante antes de reunirse con <a href="#">personas en riesgo de enfermedad grave, adultos mayores, inmunocomprometidos</a> o personas que <a href="#">no están al día con sus vacunas contra el COVID-19</a> , incluidos los niños que aún no pueden vacunarse.
Usted tiene COVID-19	Hacia el final de un período de aislamiento de cinco días. <b>Si da positivo</b> , continúe aislándose hasta que lleguen a los 10 días después de que comenzaron sus síntomas. <b>Si da negativo</b> , puede dejar de aislarse, pero debe usar una máscara alrededor de los demás hasta el día 10.

Fuente: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html>

- Los **resultados positivos** de las autopruebas son altamente confiables.

- Los **resultados negativos** de la autoprueba no descartan la infección por SARS-CoV-2. Un resultado negativo de la autoprueba puede no ser confiable, especialmente si tiene síntomas asociados con el COVID-19.
- Los **resultados no válidos** de las autopruebas significan que la prueba no funcionó correctamente y se necesita una nueva prueba para obtener resultados precisos.

Si su hijo da positivo en una prueba de antígeno autoadministrada, debe:

- Aíslelos inmediatamente durante 5 días desde el resultado de la prueba o desde el inicio de los síntomas, lo que ocurra primero;
- [Complete y envíe este formulario](#) para informar su resultado positivo al Departamento de Salud del Condado de Tompkins.
- Notifique a su escuela.

Si su estudiante desarrolla síntomas o los síntomas empeoran, comuníquese con su proveedor de atención médica y busque atención adicional. Continúe usando una máscara que le quede bien alrededor de otras personas durante 5 días adicionales después del aislamiento.